

Số: 996 /SNN-TS

Hoà Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2015

V/v tăng cường các biện pháp kỹ thuật
quản lý cá nuôi lồng

Kính gửi: UBND các huyện: Mai Châu, Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc
và Thành phố Hòa Bình.

Trong thời gian qua do thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp mưa lũ từ đầu nguồn đổ về hồ làm cho môi trường nước thay đổi đột ngột, dẫn tới cá nuôi lồng bị chết tại các xã Tân Mai, Phúc Sơn huyện Mai Châu, xã Ngòi Hoa huyện Tân Lạc, xã Thung Nai huyện Cao Phong, xã Hiền Lương huyện Đà Bắc và xã Thái Thịnh Thành phố Hòa Bình. Để hạn chế thiệt hại rủi ro trong nuôi cá lồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện vùng hồ và Thành phố Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Quản lý lồng nuôi

- Những lồng, bè nuôi đã đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương tiến hành thu hoạch và tu sửa, vệ sinh lồng nuôi chuẩn bị cho vụ nuôi mới tránh thiệt hại lớn về kinh tế;

- Đối với lồng, bè đặt thành từng cụm thì các cụm lồng, bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10 m. Trong quá trình nuôi phải thường xuyên vệ sinh lồng nuôi để tăng cường lượng nước lưu thông trong lồng. Hàng ngày cần kiểm tra lồng lưới để kịp thời sửa chữa tránh thất thoát cá nuôi. Không di chuyển cá từ lồng, bè này sang lồng, bè khác khi đang có bệnh xảy ra. Đối với lồng, bè đang nuôi phải gia cố lồng nuôi vững chắc, di chuyển vào nơi neo đậu an toàn, để đảm bảo cho lồng nuôi.

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải đảm bảo không gây tổn hại cho đối tượng nuôi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng. Sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học và chất xử lý cải tạo môi trường dùng cho nuôi trồng thủy sản, còn hạn sử dụng và được phép lưu hành tại Việt Nam;

- Hàng ngày theo dõi môi trường nước và hoạt động của cá. Nếu thấy môi trường nước xấu, cá kém ăn hoặc xuất hiện bệnh phải có biện pháp xử lý kịp thời. Không xả rác, thức ăn ôi thiu, nấm mốc xuống khu vực lồng, bè và môi trường xung quanh. Thường xuyên cọ rửa lưới, khung lồng để lưu thông dòng chảy, cung cấp đủ oxy, hạn chế mầm bệnh ký sinh và không làm xây xát cá nuôi. Trước khi cho cá ăn cần kéo lồng lên vớt các loại thức ăn thừa của cá.

- Khi thấy có hiện tượng biến động môi trường mạnh, cá có hiện tượng nhiễm bệnh hoặc chết cần phải kịp thời báo cho cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương để có phương án kịp thời xử lý.

2. Công tác phòng, trị bệnh cho cá nuôi

- Treo túi vôi liều lượng từ 2-4 kg/10m³ ở giữa các lồng nuôi để cải thiện môi trường nước và sát khuẩn cho cá nuôi;

- Đặt máy bơm nước hoặc máy sục khí vào giữa các khoảng cách lồng nuôi hoặc chuyển lồng nuôi đến nơi có dòng nước chảy giúp tăng hàm lượng Ôxy trong nước;

- Tăng cường cho cá ăn đầy đủ, đúng liều lượng với các loại thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao và bổ sung Vitamin tổng hợp vào thức ăn cho cá với liều 2gram/kg thức ăn và ăn liên trong 7 ngày;

- Sử dụng chế phẩm viên treo lồng tan chậm VICATO liều lượng 50gam/10m³ cải thiện môi trường nuôi trong lồng và diệt khuẩn;

- Định kỳ sử dụng Tiên Đắc, KN 04- 12 để phòng bệnh;

- Những lồng nuôi cá có biểu hiện bệnh nên tách ra đưa xuống cuối dòng nước và sử dụng Doxycyclin (100mg/kg cá) kết hợp với Vitamin tổng hợp (2gram/kg thức ăn) trộn đều vào thức ăn cho cá ăn, thời gian cho ăn thuốc kéo dài từ 5- 7 ngày;

- Kịp thời phản ánh tình hình sản xuất thủy sản về sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp chỉ đạo;

Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện vùng hồ và Thành phố Hòa Bình triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở (đ/c Hùng);
- Phòng KHTC;
- Chi cục thủy sản;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vương Đắc Hùng